

## PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z KONTRASTEM

1. Należy przynieść wynik laboratoryjny poziomu kreatyniny (ważny jest 14 dni) oraz 1 litr wody niegazowanej.
2. **W dniu badania pacjent powinien**
  - a. być na czczo minimum 6 godzin przed wykonaniem badania
  - b. przyjść 15 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety o stanie zdrowia
  - c. przynieść **poprzednie wyniki badań** dotyczące badanej okolicy ciała
3. Pacjenci **chorzy na cukrzyce przyjmujący (Metforminę)** powinni odstawić lek na 48 godzin przed i po badaniu, jeżeli eGFR jest poniżej 60.
4. Pacjenci **chorzy na cukrzycę** przyjmujący insulinę powinni przyjść na badanie na czczo nie przyjmując insuliny, ale mieć ją ze sobą (podać po badaniu).
5. Pacjenci chorzy na cukrzycę przyjmujący Glucophage biorą lek jak zawsze i przygotowują się do badania wg w/w wytycznych.
6. Pacjenci z nadczynnością tarczycy, którzy **NIE** przyjmują Euthyrox lub Thyrozol powinni mieć aktualny wynik poziomu TSH i wynik kreatyniny.
7. W czasie podawania środka kontrastującego pacjent może odczuwać ciepło/gorąco, metaliczny posmak w ustach, uczucie parcia na mocz – są to typowe objawy, które nie powinny budzić niepokoju.
8. Jeżeli Pacjent ma eGFR poniżej 30 – należy odstąpić od badania z kontrastem.
9. Najpóźniej na 2 dni przed badaniem Pacjent powinien uzupełnić ankietę anestezyjologiczną  
Poniżej link ankiety anestezyjologicznej:

<http://www.anestezjolog.com.pl>